

# Fluconazol B. Braun 2 mg/ml

infusionsvæske, oplosning

fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedden. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørge lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)**Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol B. Braun
3. Sådan skal du bruge Fluconazol B. Braun
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

**1. Virkning og anvendelse**

Fluconazol B. Braun tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika og som bruges mod svampeinfektioner. Det aktive stof er fluconazol. Fluconazol bruges til behandling af svampeinfektioner og kan også bruges som forebyggende behandling mod *Candida*-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en gærsvamp, der hedder *Candida*.

**Voksne**

Du kan få dette lægemiddel af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

- Kryptokomnenitis – en svampeinfektion i hjernen
- Kokcidiozykose – en sygdom i lunge
- Infektioner, der skyldes *Candida* i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene
- Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og mundbetændelse på grund af tandprotese.
- Du kan også få Fluconazol B. Braun til at:
- forebygge tilbagevendende kryptokomnenitis
- forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne
- forebygge svampeinfektioner, som skyldes *Candida* (hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det ikke fungerer ordentligt).

**Børn og unge (0 til 17 år)**

Du kan få dette lægemiddel af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

- Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen
- Infektioner, der skyldes *Candida* i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene
- Kryptokomnenitis – en svampeinfektion i hjernen.

Du kan også få Fluconazol B. Braun til at:

- forebygge svampeinfektioner, som skyldes *Candida* (hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det ikke fungerer ordentligt)
- forebygge tilbagevendende kryptokomnenitis.

**2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol B. Braun**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

**Brug ikke Fluconazol B. Braun, hvis du:**

- er allergisk over for fluconazol, andre svampeinfektioner eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Symptomerne kan omfatte klø, rødme af huden eller vejrtrækningsbesvær
- tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)
- tager cisaprid (mod mageproblemer)
- tager pimozid (mod psykotiske lidelsen)
- tager kinidin (mod forstyrrelser i hjertertymen)
- tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

**Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen for du bruger Fluconazol B. Braun,

- hvis du har lever- eller nyreproblemer
- hvis du har hjerte problemer, som uregelmæssig hjertertyme
- hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

- hvis du får alvorlige hudlidelser (klo, rødme af huden eller vejrtrækningsproblemer)

- hvis du udvikler tegn på binyrebarksvig, hvor binyrner ikke producerer tilstrækkelige mængder af bestemte binyrebarkhormoner såsom kortisol (kronisk eller langvarig træthed, muskelsvaghed, nedsat appetit, vægttab, nævesmerter)

- hvis du nogensinde har fået alvorligt hudslæt eller hudafskalning, blister-dannele og/eller sår i munden efter at have brugt Fluconazol B. Braun

- hvis svampeinfektion ikke bliver bedre, da det kan være nødvendigt med en anden svampebehandling.

Der er indberettet alvorlige hudreaktioner, herunder en lægemiddelreaktion med eosinofiler og systemiske symptomer (DRESS), i forbindelse med behandling med Fluconazol B. Braun. Du skal stoppe med at bruge Fluconazol B. Braun og søge læge med det samme, hvis du får et eller flere af de symptomer, der er forbundet med disse alvorlige hudreaktioner, og som er beskrevet i punkt 4.

**Brug af andre lægemidler sammen med Fluconazol B. Braun**

- Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Fortæl det straks til lægen, hvis du tager astemizol, terfenadin (antihistaminer til behandling af allergier), cisaprid (anvendes til mageproblemer), pimozid (mod psykotiske lidelsen), kinidin (til behandling af uregelmæssig hjertertyme) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol B. Braun (se punkt 2).

**Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Fluconazol B. Braun. Tål med lægen, for du tager Fluconazol B. Braun, hvis du tager noget af følgende lægemidler:**

- rifampicin, rifabutin eller azithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

- abciximab (anvendes til at behandle atopisk dermatitis, også kendt som atopisk eksem)

- aftenantil eller fentanyl (bruges mod smerte)

- amiodaron (anvendes til behandling af uregelmæssig hjertertyme, også kaldet "arytmier")

- amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

- amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

- blodfortyndende lægemidler for at forhindre blodpropfer (warfarin eller lignende lægemidler)

- benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende lægemidler), som er sovemedicin og beroligende lægemidler

- carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)

- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydrochlorothiazid (vandrivrende lægemiddel) eller losartan (mod forhøjet blodtryk)

- olaparib (bruges til behandling af kræft i æggestokken)

- ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter transplantation)

- cyclophosphamid eller vincasalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende lægemidler), der bruges til behandling af kræft

- halofantron (mod malaria)

- statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende lægemidler), der bruges mod forhøjet kolesterol

- methadon (mod smerte)

- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-steroid antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerte eller gjært)

- orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks. p-piller)

- prednisolon (steroid)

- zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til hiv-patienter)

- lægemidler mod diabetes (sukkersyre) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid

- theophyllin (mod astma)

- tofacitinib (mod leddejagt)

- tolvaptan, der bruges til behandling af hyponatriæmi (nedsat niveau af natrium i blodet) eller til at forsinke forværing af nyrefunktionen

- A-vitamin (kosttilskud)

- ivacaftor (alleen eller i kombination med andre lægemidler til behandling af cystisk fibrose)

- ibrutinib (til behandling af blodkræft)

- lurasidon (til behandling af skizofreni).

**Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du planlægger at blive gravid, anbefales det at vente en uge efter en enkelt dosis fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

Du må ikke tage Fluconazol B. Braun, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. Hvis du bliver gravid mens du tager dette lægemiddel, eller indenfor 1 uge af den seneste dose skal du kontakte din læge.

Indtagelse af fluconazol i de første eller anden trimester af graviditeten kan øge risikoen for abort. Indtagelse af fluconazol i første trimester af graviditeten kan medføre forøget risiko for, at barnet bliver født med misindianer, der berører hjertet, knoglerne og øjne.

Hvis du har været indberettet om svampeinfektioner, som skyldes *Candida*, skal du ikke tage fluconazol, før du bliver gravid.

Ved længere behandlingsforløb med fluconazol skal du tale med lægen om behovet for at bruge passende prævention under behandlingen og i en uge efter den sidste dosis.

# Fluconazol B. Braun 2 mg/ml

infusjonsvæske, opplosning

flukonazol

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.**

- Ta være på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

## I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

- 1. Hva Fluconazol B. Braun er og hva det brukes mot
- 2. Hva du må vite før du får Fluconazol B. Braun
- 3. Hvordan Fluconazol B. Braun brukes
- 4. Mulige bivirkninger
- 5. Hvordan Fluconazol B. Braun oppbevares
- 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

## 1. Hva Fluconazol B. Braun er og hva det brukes mot

Fluconazol B. Braun tilhører en gruppe legemidler som kalles antimykotika, og som brukes mot soppinfeksjoner. Virkestoffet er flukonazol.

Flukonazol brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av sopp og kan også brukes til å forhindre at du får en candidiasis. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjærsopp som kalles *Candida*.

**Voksne:**

Du kan få dette legemidlet av legen for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:

- Kryptokokkmeningitt – soppinfeksjon i hjernen
- Koksidioidomykose – en sykdom i lunger og bronkier
- Infeksjoner som er forårsaket av *Candida* og som finnes i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
- Soppinfeksjon i slimhinnene – infeksjon på innsiden av munnen, sveigert og munnsår på grunn av tannprote

Du kan også få Fluconazol B. Braun for å:

- hindre at du får kryptokokkmeningitt på nytt
- hindre at du får soppinfeksjon i slimhinnene på nytt
- hindre at du får en infeksjon forårsaket av *Candida* (hvis du har svekket immunsystemet som ikke fungerer som det skal)

**Barn og ungdom (0 - 17 år)**

Du kan få dette legemidlet av legen for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:

- Soppinfeksjoner i slimhinnene – infeksjon på innsiden av munnen og sveigert
- Infeksjoner som er forårsaket av *Candida* og som finnes i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
- Kryptokokkmeningitt – soppinfeksjon i hjernen

Du kan også få Fluconazol B. Braun for å:

- hindre at du får en infeksjon forårsaket av *Candida* (hvis du har svekket immunsystemet som ikke fungerer som det skal)
- hindre at du får kryptokokkmeningitt på nytt

## 2. Hva du må vite før du får Fluconazol B. Braun

### Bruk ikke Fluconazol B. Braun hvis du

- er allergisk overfor flukonazol, andre legemidler som du har brukt til behandling av soppinfeksjoner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan omfatte klo, rødhett i huden eller pusteproblemer.
- tar astemizol, terfenadin (antihistaminer mot allergier)
- tar cisaprid (brukes mot mageproblemer)
- tar pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser)
- tar kinidin (brukes til behandling av infeksjoner)
- tar erytromycin (antibiotikum til behandling av infeksjoner)

### Advarslor og forsiktighetsregler

Snakk med lege for du får Fluconazol B. Braun

- dersom du har problemer med lever eller nyrer
- dersom du har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser
- dersom du har unormale mengder av kalium, kalsium eller magnesium i blodet
- dersom du utvikler alvorlige hudreaksjoner (klo, rødhett i huden eller pusteproblemer)
- dersom du utvikler tegn på nedsatt binyrefunksjon, der binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner, slik som kortisol (kronisk) eller langvarig utmattelse (fatigue), muskelsvakhet, manglende matlyst, vekttap, magesmerter
- dersom du tidligere har fått alvorlig hudutslett eller flassing, flatt blemmer og/eller munnsår etter å ha brukt Fluconazol B. Braun
- dersom soppinfeksjonen ikke blir bedre, da kan det være nødvendig med en annen type soppbehandling.

Alvorlige hudreaksjoner inkludert legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) har blitt rapportert i forbindelse med Fluconazol B. Braun-behandling. Slutt å bruke Fluconazol B. Braun, og oppsök lege umiddelbart dersom du får noen av symptomene knyttet til de alvorlige hudreaksjonene som er beskrevet i avsnitt 4.

### Andre legemidler og Fluconazol B. Braun

Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Gi umiddelbart beskjed til legen dersom du bruker astemizol, terfenadin (antihistaminer til behandling av allergier) eller cisaprid (brukes mot mageproblemer) eller pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser) eller kinidin (brukes til behandling av hjerterytmeforstyrrelser) eller erytromycin (antibiotikum til behandling av infeksjoner), da disse ikke skal tas sammen med Fluconazol B. Braun (se avsnittet "Bruk ikke Fluconazol B. Braun hvis du").

**Efekten av enkelte legemidler og Fluconazol B. Braun kan påvirkes av hverandre. Du må informere legen dersom du tar noe av de følgende legemidlene:**

- rifampicin, rifabutin eller azitromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner)
- abciximab (brukes til behandling av atopisk dermatitt, også kjent som atopisk eksem)
- aftenantil, fentanyl (brukes som bedøvelsesmiddel)
- amiodaron (brukes til behandling av uregelmessig hjerterytm, såkalte arrytmer)
- amitriptylin, nortriptylin (brukes mot depresjon)
- amfotericin B, voriconazol (soppdrepande midler)
- blodfortøyende legemidler til forebyggning av blodpropfer (warfarin eller lignende legemidler)
- benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler) brukt som sovmedisin eller mot angst
- karbamazepin, fenytin (brukes til behandling av krampeanfall)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydroklortiazid (et vanndrivrende legemiddel) og losartan (mot høyt blodtrykk)
- olaparib (brukes til behandling av kreft i eggstokkene)
- ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (for å motvirke avstøting av transplanterte organer)
- cyklofosphamid, vinkalkaloider (vinクリスト, vinblastin eller lignende legemidler) som brukes til kreftbehandling
- halofantrin (brukes til behandling av malaria)
- statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin eller lignende legemidler) som brukes til å senke høyt kolesterol
- metadon (mot smerte)
- celekoksib, flurbiprofen, naprosken, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, dikenofenak (ikke-steroid antiinflammatoriske midler (NSAID))
- orale preventjonsmidler (f.eks. p-killer)
- prednisolon (steroid)
- zidovidulin (også kjent som AZT), sakinavir (til behandling av pasienter med hiv)
- legemidler som brukes ved diabetes, f.eks. klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid)
- teofyllin (brukes til å kontrollere astma)
- tofacitinib (brukes til behandling av lediggikt (reumatoid artritt))
- tolvaptan (brukes til behandling av lavt nivå av natrum i blodet (hyponatremi) eller for å bremse sviktende nyrefunksjon)
- A-vitamin (kosttilskudd)
- ivacaftor (alene eller sammen med andre legemidler, brukes til behandling av cystisk fibrose)
- ibrutinib (brukes til behandling av blodkreft)
- lurasidon (brukes til behandling av schizofreni)

### Graviditet og amming

Snakk med lege for du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Dersom du planlegger å bli gravid, anbefales du å vente en uke etter en engangsdose med flukonazol for du blir gravid.

Snakk med lege ved behandling med flukonazol over lengre tid, om behovet for egnet prevensjon under behandlingen. Fortsett med prevensjon i én uke etter siste dose.

Du skal ikke bruke Fluconazol B. Braun dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det. Kontakt lege dersom du blir gravid mens du bruker dette legemidlet eller innen 1 uke etter at du har sistet dose. Det kan være økt risiko for spontanabort dersom man tar flukonazol i løpet av første eller andre trimester av svangerskapet. Hvis man tar flukonazol i løpet av første trimester kan det gi en økning i risikoen for at barnet blir født med misdannelsel i hjerte, skjelett og/eller muskler.

Det har vært rapportert om at kvinner som har blitt behandlet i tre måneder eller mer med høye doser (400 – 800 mg daglig) flukonazol for kryptokokkmenykoze har født barn med misdannelsel. Misdannelsene påvirker skallen, ørene og bein i føret og alben. Sammenhengen mellom flukonazol og disse tilfellene er ikke klar.

Du kan fortsette å amme etter å ha tatt en enkeltdose med på 150 mg flukonazol.

Du skal ikke amme hvis du får gjentatte doser med flukonazol.

### Kjøring og bruk av maskiner

Hvis du kjører eller bruker maskiner må du ta i betraktning at det i enkelte tilfeller kan forekomme svimmethet eller anfall.

### Fluconazol B. Braun inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder 177 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver flaske med 50 ml. Dette tilsvarer 8,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosisen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Dette legemidlet inneholder 354 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver flaske med 100 ml. Dette tilsvarer 17,7 % av den anbefalte maksimale daglige dosisen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Dette legemidlet inneholder 709 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver flaske med 200 ml. Dette tilsvarer 35,5 % av den anbefalte maksimale daglige dosisen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

## 3. Hvordan Fluconazol B. Braun brukes

Lege eller sykepleier vil gi deg dette legemidlet som saltet injeksjon (infusjon, såkalt "drypp") i en blodåre. Fluconazol B. Braun er en opplosning. Den skal ikke fortynnes ytterligere. Det er ytterligere informasjon for helsepersonell i avsnittet til slutt i pakningsvedlegget.

De anbefalte dosene for forskjellige infeksjoner er angitt nedenfor. Spør lege eller sykepleier om hvis du ikke er sikker på hvorfor du får Fluconazol B. Braun.

**Voksne**

**Behandling av kryptokokkmeningitt**

400 mg første dag, deretter 200 - 400 mg en gang daglig i 6 - 8 uker, eller lengre om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg.

**Hindre at kryptokokkmeningitt oppstår på nytt**

200 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

**Behandling av koksidioidomykose**

100 - 200 mg én gang daglig i 11 - 24 måneder, eller lengre om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg.

**Behandling av andre soppinfeksjoner forårsaket av Candida**

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

**Behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene på innledningen av munnen, sveigt eller munnsår på grunn av tannprotese**

200 - 400 mg første dag, deretter 100 - 200 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

**Behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene – dosen avhenger av hvor infeksjonen er lokalisert**

50 - 400 mg én gang daglig i 7 - 30 dager til du får beskjed om å slutte med legemidlet

**Hindre infeksjon forårsaket av Candida (hvis du har et svekket immunsystemet som ikke fungerer som det skal)**

100 - 200 mg én gang daglig så lenge det er risiko for å få en infeksjon

**Barn 12 - 17 år**

Følg doseringssanvisningene som legen har gitt (dosering enten som for barn eller som for voksne).

**Barn opp til 11 år**

Den høyeste dosen for barn er 400 mg daglig.

Dosene beregnes på grunnlag av barnets vekt i kilo (kg).

**Bruksområde**

**Dose**

Behandling av kryptokokkmeningitt

400 mg første dag, deretter 200 - 400 mg en gang daglig i 6 - 8 uker, eller lengre om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg.

Hindre at kryptokokkmeningitt oppstår på nytt

200 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Behandling av koksidioidomykose

100 - 200 mg én gang daglig i 11 - 24 måneder, eller lengre om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg.

Behandling av andre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene på innledningen av munnen, sveigt eller munnsår på grunn av tannprotese

50 - 400 mg én gang daglig i 7 - 30 dager til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Hindre infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunsystemet ikke fungerer som det skal)

100 - 200 mg én gang daglig så lenge det er risiko for å få en infeksjon

**Oppbevaring**

**Oppbevaring**

**Oppbevaring**

**Oppbevaring**

**Oppbevaring**

**Oppbevaring**

</